



DC MEDICAL s.r.o., so sídlom: Myslavská 644/190/A, 040 16 Košice, Slovenská republika, IČO: 46 599 762, Zapísaná v obchodnom registri OS Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 29900/V.

JUHAPHARM, s.r.o., so sídlom: Myslavská 644/190/A, 040 16 Košice, Slovenská republika, IČO: 31 698 441, Zapísaná v obchodnom registri OS Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 5369/V

e-mail: dermacenter.sk@gmail.com, tel.: +421903643371, fax.: +421556446317

Kontraindikácia a možné riziká spočívajúcich v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela pri ošetrovaniach vykonávaných v prevádzke DERMACENTER

Pred akýmkoľvek ošetrením každý klient musí vypísať informovaný formulár, v ktorom sú otázky formulované pre dosiahnutie informácií o jeho zdravotnom stave, ako aj reagovaním pokožky čím dochádza k predchádzaniu vzniku nežiadúcich reakcií. Vďaka získaným informáciám ošetrojúci personál vyhodnotí možnosť vykonania ošetrovania bez vzniku nežiadúcich reakcií, v prípade ak ho konkrétny pracovník nevie vyhodnotiť, je povinný konzultovať uvedené aplikácie s kolegom, najmä s lekárom v danej prevádzke. Ošetrojúci personál zároveň informuje klienta o všetkých kontraindikáciách a možných rizikách spočívajúcich v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela pri lekárskejších a kozmetických ošetrovaniach.

Každý klient je povinný oznámiť ošetrojúcemu personálu DERMACENTER (DC MEDICAL s.r.o., a/alebo JUHAPHARM, s.r.o.) všetky estetické, zdravotné, alebo technické zmeny na tele. Zároveň každý klient je riadne poučený o všetkých rizikách spočívajúcich v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela a kontraindikáciách ošetrovaní vykonávaných v DERMACENTER (DC MEDICAL s.r.o., a/alebo JUHAPHARM, s.r.o.), ktoré si dôsledne preštudovali v ich kompletnom znení umiestnenom aj v písomnej forme na prevádzke DERMACENTER, a taktiež na webstránke www.dermacenter.sk/OP. Klient po oboznámení sa so všetkými kontraindikáciami a rizikami je ochotný podstúpiť ošetrovania výhradne na vlastnú zodpovednosť.

Klient podstúpením ošetrovania, alebo podpisom informačného formuláru, alebo podpisom prehlásenia na recepcii DERMACENTER potvrdzuje, že je oboznámený s nasledovnými kontraindikáciami a možnými rizikami spočívajúcimi v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela jednotlivých ošetrovaní na prevádzke DERMACENTER (DC MEDICAL s.r.o. a JUHAPHARM s.r.o.), ktorými sú najmä nasledovné:

Hydra Beauty

Kontraindikácie

- tehotenstvo
- aktívny vírus
- rakovina
- popraskane cievky

Možné rizika spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

- začervenala pokožka
- drobné podliatiny

Radiomesolifting s pepbu:w

Kontraindikácie

- tehotenstvo
- infekcie, vírusy
- hojenie rán keloidmi, čerstvé rany
- antibiotika
- kardiosťimulátor
- cukrovka
- rakovina
- tenká pokožka
- popraskane žilky
- aplikácia botoxu
- aplikácia výplňových materiálov
- čerstvo opálená pokožka

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

- začervenanie pokožky
- opuch
- pľuzgier
- alergia na materiál pepbu:w
- rýchlejšie vstrebanie výplní a botoxu

Trvalá laserová epilácia

Kontraindikácie spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

- kardiovaskulárne choroby
- kŕčové žily
- cukrovka
- pacemaker, kardiosťimulátor
- poruchy zrážania krvi
- kožné choroby (psoriáza, ekzém, mykóza)
- vysoký krvný tlak
- ochorenie štítnej žľazy
- hojenie rán keloidom
- aktívne infekcie, herpes
- HIV/AIDS
- tetovanie alebo permanentný make-up
- kovový implantát
- injekčné výplne
- depresie/psychické choroby
- poruchy imunitného systému
- hormonálne zmeny
- hepatitída
- predchádzajúce hojenie keloidnými jazvami
- rakovina
- stredne ťažké/ ťažké aktívne akné

- liečba Roaccutan cps (izotretinoín) v posledných 18 mesiacoch
- aktívne bakteriálne / vírusové / mykotické infekčné kožné ochorenie (labiálny herpes)
- slnečné žiarenie
- solárium
- epilepsia
- tehotenstvo
- antibiotiká
- užívanie hormonálnych liekov
- poruchy štítnej žľazy

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

- prechodné začervenanie, opuch a pálenie,
- popálenie (I., II.a alebo II.b, III. stupňa), chrastavosť, presuny pigmentu hyperpigmentácie, vznik jaziev,
- aktivácia herpesu, vznik milíí,
- koža môže vyzerat' v mieste ošetrovania škvrnito, je to spôsobené zápalom vyvolaným absorpciou tepla v mieste vlasového vačku, môže pretrvavat',
- ošetrované pigmentové lézie môžu tesne po zákroku stmavnúť,
- ošetrované cievne lézie vymiznú okamžite alebo prechodne sfialovejú, difúzne začervenanie sa po ošetrovaní zvýrazní a následne do 2-3 týždňov bledne, ošetrovanie vaskulárnych lézií, väčšinou vyžaduje 3 ošetrovania,
- oblasti, škvrny tmavšej kože, vyššie riziko je u klientov s tmavším typom pokožky,
- oblasti, škvrny svetlejšej kože, vyššie riziko je u klientov s tmavším typom pokožky,
- vznik pľuzgierov, v prípade vytvorenia pľuzgiera je dôležité ten neprepichovat' a nestláčať, aby sa nevytvorila jazva alebo nevznikol zápal.
- mierne pálenie, ktoré môže pretrvavat' 2-5 hodín, je zvyčajne sprevádzané miernym začervenaním, ošetrované miesto je cca 2 dni citlivejšie na teplo
- po ošetrovaní DIÓDOVÝM LASEROM môže koža vyzerat' v mieste ošetrovania škvrnito, je to spôsobené zápalom vyvolaným absorpciou tepla v mieste vlasového vačku, môže pretrvavat' 2-24 hod.
- ošetrované pigmentové lézie môžu tesne po zákroku stmavnúť, následne medzi 7-28 dňom odpadnú (podľa miesta ošetrovania) alebo vymiznú
- ošetrované cievne lézie vymiznú okamžite alebo prechodne sfialovejú, difúzne začervenanie sa po ošetrovaní zvýrazní a následne do 2-3 týždňov bledne, ošetrovanie vaskulárnych lézií väčšinou vyžaduje 3 ošetrovania,

CryoPro

Kontraindikácie

- tehotenstvo
- rosacea
- otvorene rany
- herpes
- alergia na chlad
- čerstvé jazvy

Možné rizika spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

- začervenala pokožka
- pľuzgier
- rozšírenie cievky

- omrzliny

Laserové odbúravanie tuku

Kontraindikácie

- tehotenstvo, dojčenie
- infekcie, vírusy, zápal v tele
- hojenie rán keloidmi, čerstvé rany
- antibiotika
- kardiostimulátor
- cukrovka
- rakovina
- ochorenie vylučovacieho systému
- tenká pokožka
- krčové žily, trombóza, popraskané žilky
- menštruácia

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

- začervenanie pokožky
- opuch
- pľuzgier
- modrina
- záťaž na vylučovací systém

Sono hydrolipoklasia

Kontraindikácie

- rakovina s metastázami
- vážne srdcové choroby
- kardiostimulátor alebo implantované elektródy
- vážne kožné choroby
- neurologické patológie
- postihnutý žilový a lymfatický systém
- tuberkulóza
- tehotenstvo
- menštruácia
- vnútromaternicová antikoncepcia
- hepatopatia
- vysoká hladina cholesterolu (viac ako 300ml/dl)
- vysoká hladina triglyceridov (viac ako 500ml/dl)
- na oblastiach tela blízko endovaskulárnych implantátov v artériách dolných končatín
- na oblastiach tela blízko ischemických tkanív, na ranách a vredoch
- krvácanie
- znížená citlivosťou na bolesť kvôli operáciám, anestéze
- implantát alebo kovový implantát, v prípade že je ošetrovanie vykonávané blízko oblasti s implantátom
- neschopnosť komunikovať
- s hrúbkou mäkkého tkaniva menšou ako 3cm
- poranená, podráždená, začervenaná koža alebo aktívne infekcie
- trpenie alebo známky vaskulárnych ťažkostí na ošetrovanom mieste
- krčové žily na ošetrovanom mieste
- kapilárna krehkosť na ošetrovanom mieste
- nedávna aplikácia chemického peelingu na ošetrovanom mieste
- užívanie anti-koagulačných liekov
- kolagénova choroba
- ischyózna alebo iný druh kožnej keratinizácie
- bakteriálne alebo mykotické kožné infekcie

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela:

- modriny
- opuch
- začervenanie pokožky
- drobné pľuzgieriky
- záťaž na vylučovací systém

Neinvazívne odbúravanie tuku (BODYKA) :

Kontraindikácie:

- rakovina s metastázami
- vážne srdcové choroby
- kardiostimulátor alebo implantované elektródy
- vážne kožné choroby
- neurologické patológie
- postihnutý žilový a lymfatický systém
- tuberkulóza
- tehotenstvo
- menštruácia
- vnútromaternicová antikoncepcia
- hepatopatia
- vysoká hladina cholesterolu (viac ako 300ml/dl)
- vysoká hladina triglyceridov (viac ako 500ml/dl)
- na oblastiach tela blízko endovaskulárnych implantátov v artériách dolných končatín
- na oblastiach tela blízko ischemických tkanív, na ranách a vredoch
- krvácanie
- znížená citlivosťou na bolesť kvôli operáciám, anestéze
- implantát alebo kovový implantát, v prípade že je ošetrovanie vykonávané blízko oblasti s implantátom
- neschopnosť komunikovať
- s hrúbkou mäkkého tkaniva menšou ako 3cm
- poranená, podráždená, začervenaná koža alebo aktívne infekcie
- trpenie alebo známky vaskulárnych ťažkostí na ošetrovanom mieste
- krčové žily na ošetrovanom mieste
- kapilárna krehkosť na ošetrovanom mieste
- nedávna aplikácia chemického peelingu na ošetrovanom mieste
- užívanie anti-koagulačných liekov
- kolagénova choroba
- ischyózna alebo iný druh kožnej keratinizácie
- bakteriálne alebo mykotické kožné infekcie

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela:

- opuch
- začervenanie pokožky
- drobné pľuzgieriky
- záťaž na vylučovací systém

RF tvarovanie postavy

- tehotenstvo, dojčenie
- infekcie, vírusy, zápal v tele
- hojenie rán keloidmi, čerstvé rany
- antibiotika
- kardiostimulátor,
- cukrovka
- rakovina
- ochorenie vylučovacieho systému

- tenká pokožka
- krčové žily, trombóza, popraskané žilky
- menštruácia

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

- začervenanie pokožky
- opuch
- pľuzgier
- modrina
- záťaž na vylučovací systém

AW profilovanie tela

Kontraindikácie

- tehotenstvo, dojčenie
- infekcie, vírusy, zápal v tele
- čerstvé rany
- antibiotika
- kardiosťimulátor
- cukrovka
- rakovina
- tenká pokožka
- krčové žily, trombóza, popraskané žilky
- ochorenie vylučovacieho systému

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

- začervenanie pokožky
- opuch
- modrina
- záťaž na vylučovací systém

Fotorejuvenizácia

Kontraindikácie

- slnečné žiarenie
- solárium
- alergia na slnko
- hojenie rán keloidmi
- vírusové ochorenia
- epilepsia
- rakovina
- tehotenstvo
- antibiotiká
- užívanie hormonálnych liekov
- kardiovaskulárne ochorenia
- poruchy štítnej žľazy

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

- prechodné začervenanie, opuch a pálenie
- popálenie, chrastička, presuny pigmentu-hyperpigmentácia, vznik jaziev
- aktivácia herpesu, vznik milíí
- koža môže vyzerať v mieste ošetrovania škvrnito, je to spôsobené zápalom vyvolaným absorpciou tepla v mieste vlasového vačku, môže pretrvávať
- vzniknuté pľuzgieri neprepichovať a nestláčať
- nechodiť po ošetrovaní do sáun ani do domácich kúpeľov 5 dní po ošetrovaní
- vyvarovať sa alkoholickým nápojmi
- nestrhávať chasty násilne
- chrániť sa pred slnečným žiarením
- vyvolanie epileptického záchvatu

Rádiotermolifting

Kontraindikácie

- tehotenstvo
- infekcie, vírusy
- hojenie rán keloidmi, čerstvé rany
- antibiotika
- kardiosťimulátor,
- cukrovka
- rakovina
- tenká pokožka
- popraskané žilky
- aplikácia botoxu
- aplikácia výplňových materiálov

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

- začervenanie pokožky
- opuch
- pľuzgier
- rýchlejšie vstrebanie vyplní a botoxu

Diamantová mikrodermabrazia

Kontraindikácie

- tehotenstvo
- vírusové ochorenia
- hormonálne lieky
- hojenie rán keloidmi
- popraskané žilky
- opálená pokožka
- nadmerné množstvo zápalových procesov
- rosacea

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

- začervenanie pokožky
- opuch
- chrastičky
- vznik jemných podliatin
- jemné škrabance

Lymfodrenáž

Kontraindikácie

- tehotenstvo, dojčenie
- infekcie, vírusy, zápal v tele
- čerstvé rany
- antibiotika
- kardiosťimulátor
- cukrovka
- rakovina
- tenká pokožka
- krčové žily, trombóza, popraskané žilky
- ochorenie vylučovacieho systému
- menštruácia

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

- začervenanie pokožky
- opuch
- modrina
- záťaž na vylučovací systém

Lymphobiony

Kontraindikácie

- kovový implantát
- kardiovaskulárne ochorenia, kardiostimulátor
- rakovina
- tehotenstvo
- herpes
- rany na pokožke

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

- začervenaná pokožka
- svrbenie
- kovová chuť v ústach počas ošetrenia

Oxylifting

Kontraindikácie

- aktívny vírus
- alergia na chlad
- prechladenie
- zápal horných dýchacích ciest

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

- začervenanie pokožky
- zápal horných dýchacích ciest

Oxy dermabrazia

Kontraindikácie

- aktívny vírus
- alergia na chlad
- prechladenie
- zápal horných dýchacích ciest

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

- začervenanie pokožky
- zápal horných dýchacích ciest

Galvanicky prístroj

Kontraindikácie

- kovový implantát
- kardiovaskulárne ochorenia, kardiostimulátor
- rakovina
- tehotenstvo
- herpes
- rany na pokožke

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

- začervenaná pokožka
- svrbenie
- kovová chuť v ústach počas ošetrenia

HF Therapy

Kontraindikácie

- tehotenstvo

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

- pľuzgier
- popálenie

Laser

Kontraindikácie

- alergia na svetlo

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

- poškodenie zraku

Pepbu:w

Kontraindikácie

- aktívny zápal na pleti
- herpes
- tehotenstvo
- čerstvé rany
- antibiotiká
- cukrovka
- rakovina
- tenká pokožka
- popraskané žilky
- hojenie rán keloidmi
- čerstvo opálená pokožka

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

- začervenanie
- drobné vpichy
- opuch
- modrina
- alergia na daný materiál

CO2 resurfacing

Kontraindikácie

- kardiovaskulárne choroby
- kŕčové žily
- cukrovka
- pacemaker, kardiostimulátor
- poruchy zrážania krvi
- kožné choroby (psoriáza, ekzém, mykóza)
- vysoký krvný tlak
- ochorenie štítnej žľazy
- hojenie rán keloidom
- aktívne infekcie, herpes
- HIV/AIDS
- tetovanie alebo permanentný make-up
- kovový implantát
- injekčné výplne
- depresie/psychické choroby
- poruchy imunitného systému
- hormonálne zmeny
- hepatitída
- predchádzajúce hojenie keloidnými jazvami
- rakovina
- stredne ťažké/ ťažké aktívne akné
- liečba Roaccutan cps (izotretinoín) v posledných 18 mesiacoch
- aktívne bakteriálne / vírusové / mykotické infekčné kožné ochorenie (labiálny herpes)
- slnečné žiarenie
- solárium
- epilepsia
- tehotenstvo
- antibiotiká
- užívanie hormonálnych liekov

- poruchy štítnej žľazy

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

- prechodné začervenanie, opuch a pálenie,
- popálenie (I., II.a alebo II.b, III. stupňa), chrastavitosť, presuny pigmentu hyperpigmentácie, vznik jaziev,
- aktivácia herpesu, vznik milíí,
- koža môže vyzeráť v mieste ošetrovania škvrnito, je to spôsobené zápalom vyvolaným absorpciou tepla v mieste vlasového vačku, môže pretrvávať,
- ošetrované pigmentové lézie môžu tesne po zákroku stmavnúť,
- ošetrované cievne lézie vymiznú okamžite alebo prechodne sfialovejú, difúzne začervenanie sa po ošetrení zvýrazní a následne do 2-3 týždňov bledne, ošetrovanie vaskulárnych lézií, väčšinou vyžaduje 3 ošetrovania,
- oblasti, škvrnny tmavšej kože, vyššie riziko je u klientov s tmavším typom pokožky,
- oblasti, škvrnny svetlejšej kože, vyššie riziko je u klientov s tmavším typom pokožky,
- vznik pľuzgierov, v prípade vytvorenia pľuzgiera je dôležité ten neprepichovať a nestláčať, aby sa nevytvorila jazva alebo nevznikol zápal.
- mierne pálenie, ktoré môže pretrvávať 2-5 hodín, je zvyčajne sprevádzané miernym začervenaním, ošetrované miesto je cca 2 dni citlivejšie na teplo
- po ošetrení CO2 laserom RF môže koža vyzeráť v mieste ošetrovania škvrnito, je to spôsobené zápalom vyvolaným absorpciou tepla v mieste vlasového vačku, môže pretrvávať 2-24 hod.
- ošetrované pigmentové lézie môžu tesne po zákroku stmavnúť, následne medzi 7-28 dňom odpadnú (podľa miesta ošetrovania) alebo vymiznú
- ošetrované cievne lézie vymiznú okamžite alebo prechodne sfialovejú, difúzne začervenanie sa po ošetrení zvýrazní a následne do 2-3 týždňov bledne, ošetrovanie vaskulárnych lézií väčšinou vyžaduje 3 ošetrovania,

DUET RF- termálna a frakčná rádiová frekvencia

Kontraindikácie

- kardiovaskulárne choroby
- krčové žily
- cukrovka
- pacemaker, kardiostimulátor
- poruchy zrážania krvi
- kožné choroby (psoriáza, ekzém, mykóza)
- vysoký krvný tlak
- ochorenie štítnej žľazy
- hojenie rán keloidom
- aktívne infekcie, herpes
- HIV/AIDS
- tetovanie alebo permanentný make-up
- kovový implantát
- injekčné výplne
- depresie/psychické choroby
- poruchy imunitného systému
- hormonálne zmeny
- hepatitída
- predchádzajúce hojenie keloidnými jazvami
- rakovina
- stredne ťažké/ ťažké aktívne akné

- liečba Roaccutan cps (izotretinoín) v posledných 18 mesiacoch
- aktívne bakteriálne / vírusové / mykotické infekčné kožné ochorenie (labiálny herpes)
- slnečné žiarenie
- solárium
- epilepsia
- tehotenstvo
- antibiotiká
- užívanie hormonálnych liekov
- poruchy štítnej žľazy

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

- prechodné začervenanie, opuch a pálenie,
- popálenie (I., II.a alebo II.b, III. stupňa), chrastavitosť, presuny pigmentu hyperpigmentácie, vznik jaziev,
- aktivácia herpesu, vznik milíí,
- koža môže vyzeráť v mieste ošetrovania škvrnito, je to spôsobené zápalom vyvolaným absorpciou tepla v mieste vlasového vačku, môže pretrvávať,
- ošetrované pigmentové lézie môžu tesne po zákroku stmavnúť,
- ošetrované cievne lézie vymiznú okamžite alebo prechodne sfialovejú, difúzne začervenanie sa po ošetrení zvýrazní a následne do 2-3 týždňov bledne, ošetrovanie vaskulárnych lézií, väčšinou vyžaduje 3 ošetrovania,
- oblasti, škvrnny tmavšej kože, vyššie riziko je u klientov s tmavším typom pokožky,
- oblasti, škvrnny svetlejšej kože, vyššie riziko je u klientov s tmavším typom pokožky,
- vznik pľuzgierov, v prípade vytvorenia pľuzgiera je dôležité ten neprepichovať a nestláčať, aby sa nevytvorila jazva alebo nevznikol zápal.
- mierne pálenie, ktoré môže pretrvávať 2-5 hodín, je zvyčajne sprevádzané miernym začervenaním, ošetrované miesto je cca 2 dni citlivejšie na teplo
- po ošetrení DUET RF laserom môže koža vyzeráť v mieste ošetrovania škvrnito, je to spôsobené zápalom vyvolaným absorpciou tepla v mieste vlasového vačku, môže pretrvávať 2-24 hod.
- ošetrované pigmentové lézie môžu tesne po zákroku stmavnúť, následne medzi 7-28 dňom odpadnú (podľa miesta ošetrovania) alebo vymiznú
- ošetrované cievne lézie vymiznú okamžite alebo prechodne sfialovejú, difúzne začervenanie sa po ošetrení zvýrazní a následne do 2-3 týždňov bledne, ošetrovanie vaskulárnych lézií väčšinou vyžaduje 3 ošetrovania,

Q-switched- odstránenie tetovania, tonizácia pleti, odstránenie cievok, odstránenie pigmentových škvŕn

Kontraindikácie

- kardiovaskulárne choroby
- krčové žily
- cukrovka
- pacemaker, kardiostimulátor
- poruchy zrážania krvi
- kožné choroby (psoriáza, ekzém, mykóza)
- vysoký krvný tlak
- ochorenie štítnej žľazy
- hojenie rán keloidom
- aktívne infekcie, herpes
- HIV/AIDS
- tetovanie alebo permanentný make-up
- kovový implantát

- injekčné výplne
- depresie/psychické choroby
- poruchy imunitného systému
- hormonálne zmeny
- hepatitída
- predchádzajúce hojenie keloidnými jazvami
- rakovina
- stredne ťažké/ ťažké aktívne akné
- liečba Roaccutan cps (izotretinoín) v posledných 18 mesiacoch
- aktívne bakteriálne / vírusové / mykotické infekčné kožné ochorenie (labiálny herpes)
- slnečné žiarenie
- solárium
- epilepsia
- tehotenstvo
- antibiotiká
- užívanie hormonálnych liekov
- poruchy štítnej žľazy

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

- prechodné začervenanie, opuch a pálenie,
- popálenie (I., II.a alebo II.b, III. stupňa), chrastavitosť, presuny pigmentu hyperpigmentácie, vznik jaziev,
- aktivácia herpesu, vznik milíí,
- koža môže vyzerat' v mieste ošetrovania škvrnito, je to spôsobené zápalom vyvolaným absorpciou tepla v mieste vlasového vačku, môže pretrvávajúť,
- ošetrované pigmentové lézie môžu tesne po zákroku stmavnúť,
- ošetrované cievne lézie vymiznú okamžite alebo prechodne sfialovejú, difúzne začervenanie sa po ošetrovaní zvýrazní a následne do 2-3 týždňov bledne, ošetrovanie vaskulárnych lézií, väčšinou vyžaduje 3 ošetrovania,
- oblasti, škvrnny tmavšej kože, vyššie riziko je u klientov s tmavším typom pokožky,
- oblasti, škvrnny svetlejšej kože, vyššie riziko je u klientov s tmavším typom pokožky,
- vznik pľuzgierov, v prípade vytvorenia pľuzgiera je dôležité ten neprepichovať a nestláčať, aby sa nevytvorila jazva alebo nevznikol zápal.
- mierne pálenie, ktoré môže pretrvávajúť 2-5 hodín, je zvyčajne sprevádzané miernym začervenaním, ošetrované miesto je cca 2 dni citlivejšie na teplo
- po ošetrovaní Q-SWITCHED LASER môže koža vyzerat' v mieste ošetrovania škvrnito, je to spôsobené zápalom vyvolaným absorpciou tepla v mieste vlasového vačku, môže pretrvávajúť 2-24 hod.
- ošetrované pigmentové lézie môžu tesne po zákroku stmavnúť, následne medzi 7-28 dňom odpadnú (podľa miesta ošetrovania) alebo vymiznú
- ošetrované cievne lézie vymiznú okamžite alebo prechodne sfialovejú, difúzne začervenanie sa po ošetrovaní zvýrazní a následne do 2-3 týždňov bledne, ošetrovanie vaskulárnych lézií väčšinou vyžaduje 3 ošetrovania,

Carboxy

Kontraindikácie

- ischemická choroba srdca
- akútne embólie
- tromboflebitidy a flebotrombóza
- gangrény
- obličkové zlyhanie

- nekompenzovaný vysoký tlak a prekonaná mozgová príhoda
- tehotenstvo
- kojenie

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

- začervenanie
- pocit praskania
- pocit tlaku
- pocit bolesti
- vznik drobných modriniiek
- opuch v mieste podania

Dysport

Kontraindikácie

- tehotenstvo,
- nervovosvalové ochorenia (Myastenia gravis, Lambert Eaton syndróm),
- poruchy zrážania krvi,
- zápal v mieste vpichu,
- užívanie niektorých liekov (aminoglykozidové antibiotiká, spektinomycín, myorelaxanciá, lokálne anestetiká, nesteroidné antireumatiká, antikoagulanciá, blokátory kalciových kanálov, antimalariká, succinylcholin, tubocurarin, inhibítory cholinéraz)
- kojenie

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

- svrbenie
- začervenanie
- drobné modriny v mieste vpichu
- bolesti hlavy
- veľmi zriedka dvojité videnie
- prechodné chrípkové znaky (spontánne zmiznú po 2-4 dňoch)
- pokles horného viečka (aplikácia v oblasti medzi obočím)
- pokles obočia (aplikácia v oblasti čela)
- asymetrický úsmev (ústne kútiky) a pod. (upravia sa behom 2-4 týždňov)
- nedostavenie efektu (prítomnosť protilátok v organizme proti botulotoxínu typu A, dysportu)

Prime Lifting- aplikácia mezonití

Kontraindikácie

- autoimunitné ochorenie a zápalové ochorenia spojiva
- prítomnosť zápalového ložiska na koži alebo permanentných injekčných implantátov v mieste predpokladaného ošetrovania
- sklon k tvorbe keloidných jaziev či dyschromie
- dekompenzované endokrinné poruchy či ťažké kardiovaskulárne ochorenia
- tehotenstvo a kojenie

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

- mierne začervenanie a bolestivosť v mieste aplikácie (v dôsledku traumatizácie tkaniva)

- lokálny opuch alebo modriny v dôsledku traumatizácie ciev, ktoré odoznejú v priebehu týždňa
- ojedinele môže vznikáť dlhodobé začervenanie alebo vyrážka pripomínajúca akné (v prípade nedodržania režimových opatrení po prevedení procedúry)

Pluryal- aplikácia kyseliny hyalurónovej

Kontraindikácie

- tehotenstvo,
- nervosvalové ochorenia (Myastenia gravis, Lambert Eaton syndróm),
- poruchy zrážania krvi,
- zápal v mieste vpichu,
- užívanie niektorých liekov (aminoglykozidové antibiotiká, spektinomycín, myorelaxanciá, lokálne anestetiká, nesteroidné antireumatiká, antikoagulanciá, blokátory kalciových kanálov, antimalariká, sukcinylcholín, tubocurarin, inhibítory cholinéraz)
- kojenie

Možné riziká spočívajúce v nepredvídateľnej reakcii ľudského tela

- začervenanie, opuchnutie, svrbenie, modriny, citlivosť v ošetrovanej oblasti
- stvrdnutie alebo vytvorenie hrčky v mieste vpichu strata pigmentu v mieste vpichu
- slabý efekt alebo slabý efekt vyplnenia, ak je Pluryal vpichnutý do pokožky nesprávne
- Prípady glaberalnej nekrózy, abscesu, granulómov a precitlivenosti môžu nastať v dôsledku vstreknutia kyseliny hyalurónovej.